

Betegájékoztató: Információk a felhasználó számára

Epavir lágy kapszula

Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz! Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógy-szerésze által elmondottaknak megfelelően szedje!

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak!

Tulajdonság, hatás

Herpesvírus ellen orvosilag alkalmasnak talált gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény.

Az Epavir lágy kapszula hatóanyagai

362 mg Omega-3-sav-etilészterek 60 (amely tartalmaz min. 35% eikosa-pentaénsav (EPA)-etilésztert és min. 25% dokozahexaénsav (DHA)-etil-észtert), 203 mg lizin-hidroklorid / kapszula.

Mit tartalmaz még a készítmény?

Segédanyagok: lecitin, vízmentes kolloid szilícium-dioxid

Kapszulahéj: vörös vas-oxid (E172), fekete vas-oxid (E172), titán-dioxid (E171), tisztított víz, nem kristályosodó szorbit-szirup, 85%-os glicerin, zselatin.

Mikor ajánlott az Epavir lágy kapszula szedése?

Szájon, nemi szerveken előforduló Herpes simplex fertőzés kezelésére. Előnyösen alkalmazható a vírusfertőzés kezdeti stádiumában, a kialakuló tünetek megelőzésére, visszaszorítására.

Mikor nem szabad szedni a kapszulát?

A készítmény bármely ható-, vagy segédanyagával szembeni ismert túlérzékenység esetén, valamint nem alkalmazható vérzési rendellenességben, hemofília.

Mit kell tudnia a kapszula szedésének megkezdése előtt?

A kapszula hatékonysága akkor optimális, ha megelőzésszerűen ill. a legelső tünetek megjelenésekor megkezdjük a kezelést.

Szedhetik-e az Epavir lágy kapszulát gyermekek?

A kapszula gyermekeknél történő biztonságos alkalmazására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért 12 éves kor alatt nem alkalmazható.

Lehet-e az Epavir lágy kapszulát gyógyszerekkel egyidejűleg szedni?

A kapszula hatóanyaga K-vitamin tartalmú, ezért vérzéscsillapító-, és véralvadásgátló gyógyszerrel történő szedése előtt beszéljen kezelőorvosával.

Mi a teendő, ha Ön várandós, szoptat vagy gyermeket szeretne?

Ezen élethelyzetekben végzett vizsgálatok eredményei nem állnak rendelkezésre, ezért a készítmény alkalmazása általános óvatosságból nem javasolt.

Hogyan és milyen adagolásban ajánlott az Epavir lágy kapszula szedése?

Felnőtteknek és 12 éves kor fölötti serdülőknek naponta 4 x 2 kapszula. A kapszulákat étkezés előtt ajánlott bevenni, a tünetek megszűnéséig.

Milyen mellékhatásai lehetnek az Epavir lágy kapszulának?

- Az összetevőkkel szembeni egyéni túlérzékenység esetén allergiás reakciók (pl. viszketés, kiütés, csalánkiütés) előfordulhat. A tünetek előfordulási gyakorisága nem ismert.
- Ritkán gyomor-bélrendszeri zavarok pl. hányinger, puffadás, hasmenés, székrekedés jelentkezhetnek.

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

Mire kell még ügyelni a készítmény szedése során?

Hosszan tartó kúra során a vérzési idő megnyúlhat.
A készítmény gyermekek elől elzárva tartandó!

Mennyi ideig szedhető a készítmény?

A készítmény folyamatosan szedhető, de ajánlatos 2-3 hónap után 1-2 hét szünetet tartani.

Hogyan kell tárolni az Epavir lágy kapszulát?

Legfeljebb 25° C-on, nedvességtől, fénytől védve tárolandó.

Nyilvántartási szám: OGYI-940/2005

Milyen az Epavir lágy kapszula külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Leírás: halvány szürkés-lila színű átlátszatlan ovális lágy kapszula vajszínű, erősen halolaj szagú, sűrű szuszpenzió töltettel.

Csomagolás: Alu / PVC buboréksomagolásban, dobozban.

Csomagolási egység: 30 db (3x10 db)

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Sinnex Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A

2017. február 13.